



DOI: 10.22141/2307-1257.4.18.2016.84326

Резюме керівництва NGC (2016): КАНАГЛІФЛОЗИН, ДАПАГЛІФЛОЗИН І ЕМПАГЛІФЛОЗИН ЯК МОНОТЕРАПІЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-го ТИПУ

Guideline Summary NGC (2016): CANAGLIFLOZIN, DAPAGLIFLOZIN AND EMPAGLIFLOZIN AS MONOTHERAPIES FOR TREATING TYPE 2 DIABETES

**Національний інститут охорони здоров'я
та догляду (NICE)**

14 червня 2016 – політика зовнішнього веб-сайта канагліфлозину (Інвокана, Інвокамет) і дапагліфлозину (Фарксіга, Ксігдуо XR): Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) посилює існуюче попередження про ризик гострого пошкодження нирок при лікуванні діабету 2-го типу препаратами канагліфлозин (Інвокана, Інвокамет) і дапагліфлозин (Фарксіга, Ксігдуо XR). Грунтуючись на останніх даних, вони переглянули необхідність попередження на етикетках препаратів про гостре пошкодження нирок і додали рекомендації щодо мінімізації цього ризику.

Основні рекомендації

Канагліфлозин, дапагліфлозин і емплагліфлозин як монотерапія рекомендовані як опції вибору для лікування діабету 2-го типу в дорослих, яким протипоказаний метформін або які його не переносять, і коли дієта та фізичні вправи поодиночки не забезпечують адекватного глікемічного контролю, тільки якщо:

А) в іншому випадку буде призначено інгібітор дипептидилпептидази-4 (ДПП-4) та

В) сульфонілсечовина або піоглітазон не підходять.

Дорослі, лікування яких канагліфлозином, дапагліфлозином або емплагліфлозином як монотерапія не було рекомендоване керівництвом Національного інституту охорони здоров'я та догляду (NICE), але було розпочате в рамках Національної служби охорони здоров'я (NHS), перш ніж це керівництво було опубліковано, повинні мати змогу продовжувати лікування, поки вони та їх лікуючий лікар від NHS не вважатимуть за доцільне його припинити.

**National Institute for Health and Care
Excellence (NICE)**

June 14, 2016 – Canagliflozin (Invokana, Invokamet) and Dapagliflozin (Farxiga, Xigduo XR) External Web Site Policy: The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has strengthened the existing warning about the risk of acute kidney injury for the type 2 diabetes medicines canagliflozin (Invokana, Invokamet) and dapagliflozin (Farxiga, Xigduo XR). Based on recent reports, they have revised the warnings in the drug labels to include information about acute kidney injury and added recommendations to minimize this risk.

Major Recommendations

Canagliflozin, dapagliflozin and empagliflozin as monotherapies are recommended as options for treating type 2 diabetes in adults for whom metformin is contraindicated or not tolerated and when diet and exercise alone do not provide adequate glycaemic control, only if:

A) dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor would otherwise be prescribed and

B) sulfonylurea or pioglitazone is not appropriate.

Adults whose treatment with canagliflozin, dapagliflozin or empagliflozin as monotherapy is not recommended in this National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidance, but was started within the National Health Services (NHS) before this guidance was published, should be able to continue treatment until they and their NHS clinician consider it appropriate to stop.

Переклад: к.м.н. М.Д. Іванова

За редакцією акад. НАМН України, члена-кор. НАН України, д.м.н., проф. Л.А. Пирога ■